

# HIPRASUIS GLÄSSER

## Vacuna inactivada, E. Glässer, en suspensión inyectable

### COMPOSICIÓN POR DOSIS:

*Haemophilus parasuis* inactivado serotipo SV1; *Haemophilus parasuis* inactivado serotipo SV6.

En los últimos años, uno de los procesos bacterianos de mayor relevancia en el ganado porcino han sido las infecciones por microorganismos del género *Haemophilus sp.* Dentro de este grupo, *Haemophilus parasuis* es el agente etiológico de la enfermedad de Glässer, que puede afectar a cerdos de distintas edades y pesos.

Sin embargo, la mayor incidencia se da en animales en la fase de posdestete y primeras semanas de cebo.

Después de numerosos estudios científicos realizados en nuestro Laboratorio de Diagnósticos a partir de animales con graves procesos clínicos de origen bacteriano, debidos a *Haemophilus parasuis*, se ha llegado al diseño de una vacuna en la que se engloban los dos serotipos más convenientes en la prevención de la enfermedad de Glässer, patología que clínicamente se caracteriza por producir artritis, poliserositis y, esporádicamente, meningitis, en cerdos afectados. Estos dos serotipos, debidamente inactivados y adyuvantados, si son aplicados correctamente, producen un elevado efecto inmunógeno.

### INDICACIONES:

**Cerdos:** Prevención de la Enfermedad de Glässer.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, en los músculos del cuello.

### POSOLÓGÍA:

**Cerdos:** 2 ml/cerdo, independientemente de su peso, edad y sexo.

En general, es aconsejable el siguiente programa vacunal orientativo:

**Cerdas:** Vacunación de todo el efectivo, revacunando 3 semanas más tarde. Aplicar una dosis de refuerzo cada 6 meses.

**Lechones y Cerdos destetados:** Vacunación a las 3-4 semanas de edad, revacunando 3 semanas después.

### TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

### OBSERVACIONES:

- Puede administrarse en cualquier momento durante la gestación y lactación de las cerdas.
- Puede aparecer una reacción anafiláctica esporádica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar el tratamiento adecuado.

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a +25 °C.
- Agitar antes de usar.
- Guardar entre +2 y +8 °C. No congelar.

### PRESENTACIÓN:

Caja 50 ds (100 ml).

Importado y distribuido por HIPRA COLOMBIA, S.A.S., Bogotá, Colombia.

Reg. ICA n° 7167-BV

Consulte al Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños

PARA USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. [hipra@hipra.com](mailto:hipra@hipra.com)