

MYPRAVAC® SUIS

Bacterina inactivada, Neumonía enzoótica, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ml):

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa J $\geq 1,0$ DE₈₀ cobayo.

INDICACIONES:

Cerdos: Inmunización activa de lechones para prevenir la Neumonía enzoótica a partir de los 7-10 días de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vacunar mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, en la zona cervical lateral detrás de la oreja. Se recomienda que las dosis vacunales se administren en zonas alternas.

POSOLOGÍA:

Cerdos: 2 ml/ cerdo.

Esquema vacunal recomendado:

Cerdos: Vacunación inicial a los 7-10 días de edad. Revacunar 21 días después. Se recomienda atemperar la vacuna entre +15 y +25 °C antes de su administración.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales enfermos.

REACCIONES ADVERSAS:

Como en todos los animales vacunados, pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad, así como reacciones locales en el punto de inoculación que remiten a los pocos días.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Agitar antes de usar.
- Guardar entre +2 y +8 °C. No congelar.
- Los animales vacunados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 2 días después de la vacunación.

PRESENTACIÓN:

- Frasco de 10 dosis.
- Frasco de 50 dosis.
- Frasco de 125 dosis.
- Frasco de 250 dosis.
- Caja de 10 frascos de 10 dosis.
- Caja de 10 frascos de 50 dosis.

Importado y distribuido por HIPRA COLOMBIA, S.A.S., Bogotá, Colombia.

Reg. ICA n° 7987-BV
Consulte al Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños

PARA USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com